

# Scopolan, czopki doodbytnicze na stany skurczowe od 6 roku życia 0,01g, 6 czopków

Cena: 15,47 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Postać	czop.doodbyt.
Producent	WROŚŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.



## Opis produktu

### Wskazania

Scopolan czopki doodbytnicze to lek dostępny bez recepty, który stosuje się w dolegliwościach bólowych w stanach skurczowych:

- przewodu pokarmowego (np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego),
- dróg żółciowych (np. kolka żółciowa),
- układu moczowo – płciowego (np. kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową, bolesne miesiączkowanie).
- odpowiedni jest dla dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i osób dorosłych.

### Właściwości

Scopolan jest lekiem zawierającym butylobromek hioscyny, który znosi stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Działanie rozkurczowe powoduje złagodzenie bolesnych skurczy przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo – płciowego.

### Stosowanie

Zalecana dawka:

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.

Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.

Jeśli objawy będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni od rozpoczęcia leczenia lub nasilą się mimo stosowania leku, pacjent powinien przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

## Ważne informacje

Lek ten powinien być przyjmowany tylko doraźnie (w przypadku wystąpienia dolegliwości) w zalecanych wskazaniach.

Stosowanie leku Scopolan należy omówić z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na:

- chorobę refluksową przełyku (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku),
- wrzodziejące zapalenie jelit,
- chorobę niedokrwioną serca,
- zwężenie ujścia mitralnego (jednej z zastawek w sercu).

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń ostrości widzenia lub bólu w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia śródgałkowego należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu lek należy stosować ostrożnie u osób z gorączką.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Skład

Substancją czynną leku jest butylobromek hioscyny – 10 mg

Substancje pomocnicze to: tłuszcz stały, polisorbit 80, parafina ciekła, woda oczyszczona.