

Sinumedin, aerozol do nosa, 15 ml



Cena: 19,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka	(1,5mg+2,5mg)/ml
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu

Sinumedin to lek, który jest stosowany w nieżytach nosa i zatok, a także przy alergii. Substancje czynne zawarte w preparacie działają przeciwhistaminowo i przeciwalergicznie (mepiramina) oraz zmniejszają przekrwienie błony śluzowej i udrażniają nos, jak również ujścia zatok przynosowych (fenylefryna), dzięki czemu ułatwia oddychanie. Dodatkowo substancja pomocnicza- chlorek cetalkoniowy ma właściwości przeciwbakteryjne. Jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia. Niewielkie, wygodne do przenoszenia opakowanie pozwala na stosowanie roztworu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.

Wskazania

Lek Sinumedin stosuje się w leczeniu nieżytu nosa (katar) w zapaleniu błony śluzowej nosa, w tym nieżytu występującego w przypadku:

- alergii,
- zapalenia zatok.

Skład

1 ml areozolu do nosa zawiera:

- substancje czynne: mepiraminy maleinianu 1,5 mg, fenylefryny chlorowodorku 2,5 mg,
- substancje pomocnicze: glicerol, sodu chlorek, cetalkoniowy chlorek, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Działanie

Lek łagodzi katar, udrażnia nos i ujścia zatok przynosowych, ułatwia oddychanie, działa przeciwbakteryjnie.

Dawkowanie

- **Dzieci powyżej 6 lat i dorośli:** 2 dawki do każdego przewodu nosowego co 4 do 6 godzin.
- Lek podaje się donosowo.
- Nie należy stosować leku częściej niż 5 razy na dobę ani dłużej niż przez 3 dni.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat i u osób chorych na astmę lub nieżyt nosa wysychający.
- Produktu nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Po zastosowaniu leku mogą wystąpić: tachykardia, kołatanie serca, arytmia, ból głowy, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bezsenność, osłabienie, biegunka, nudności, zaparcia, nadciśnienie, podrażnienie i przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość błon śluzowych.

Interakcje

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawki lub przerwania leczenia:

- barbiturany, środki nasenne i uspokajające, atropina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imipramina, opipramol, amitryptylina, doksepina, mianseryna) – Sinumedin może nasilać ich działanie,
- niektóre β -adrenolityki, takie jak esmolol, mogą nasilać działanie fenylefryny składnika Sinumedin, co może powodować u niektórych pacjentów wystąpienie ciężkiego nadciśnienia,
- inhibitory monoaminooksydazy takie jak selegilina, moklobemid, amiflamina przedłużają i nasilają działanie leku Sinumedin.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sinumedin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:
 - pacjent jest dzieckiem, lub osoba w podeszłym wieku,
 - gdy pacjent ma choroby alergiczne, lub nieżyt nosa wysychający,
 - jeśli występuje niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, guz chromochłonny, nadczynność tarczycy, przerost gruczołu krokowego,
 - jeżeli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania oraz gdy pacjent przyjmował leki stosowane w leczeniu depresji, zwane inhibitorami monoaminooksydazy (selegilina, moklobemid, amiflamina), lek Sinumedin można zastosować dopiero po upływie co najmniej 14 dni od przerwania terapii tymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Sinumedin z jedzeniem, pić i alkoholem

- Lek Sinumedin można stosować niezależnie od jedzenia i picia.
- Lek Sinumedin może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
- Leku Sinumedin nie wolno stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek Sinumedin wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Należy zachować ostrożność.

Lek Sinumedin zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan

- Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

- Lek może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.