

Theraflu Zatoki, 14 saszetek



Cena: 33,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,65g+0,01g
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Opis produktu

Wskazania

Theraflu Extragrip to lek w formie proszku do sporządzania roztworów doustnych do leczenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, bóle stawowo-mięśniowe, bóle głowy, dreszcze, kichanie, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Skład

1 saszетка zawiera: paracetamol 650mg, chlorowodorek fenylefryny 10mg; ponadto lek zawiera: sacharozę, acesulfam potasowy, żółcień chinolinową E104, żółcień pomarańczową, maltodekstrynę M100, krzemionkę koloidalną uwodnioną, naturalne aromaty cytrynowe, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian dwuwodny, wapnia fosforan.

Działanie

zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Lek wykazuje także działanie przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszетки rozpuścić w szklance wody. Jednorazowo zaleca się przyjmowanie jednej saszетки. Dawkę można powtórzyć po ok. 4-6 godzinach.

Przeciwwskazania

- nadwrażliwości (alergii) na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub inne składniki tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy #
w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona#
inhibitory IMAO, powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku opisanego w ulotce,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub bardzo wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie),
- jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy,- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania #
uszkodzeniem nerwu wzrokowego i co najmniej częściowo związanej z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej),
- jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny nadnerczy #
ciśnienia tętniczego),- jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
- jeśli pacjent przyjmuje leki beta-adrenolityczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca),
- jeśli pacjent przyjmuje doustnie inne leki sympatykomimetyczne, takie jak donosowe leki obkurczające błonę śluzową nosa, leki hamujące apetyt itp.
- ciąży i karmienia piersią
- u dzieci poniżej 12 lat.