

Unituss Junior 60 mg/ 10 ml, syrop, 120 ml



Cena: 14,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,06 g/10ml
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY

Opis produktu

Unituss Junior to lek w postaci syropu o zapachu truskawkowym, odpowiedni dla dzieci powyżej 2. roku życia i dorosłych. Substancją czynną leku jest lewodropropizyna (Levodropropizinum) o działaniu przeciwkaszlowym i znoszącym skurcz oskrzeli. Syrop stosuje się w objawowym leczeniu suchego kaszlu o różnym pochodzeniu (np. w przebiegu raka płuca, w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, przy krztuścu). Można go stosować jedynie w oczekiwaniu na rozpoznanie przyczyny kaszlu lub w oczekiwaniu na efekt leczenia choroby powodującej kaszel.

Wskazania

Lek Unituss Junior stosuje się u osób powyżej 2. roku życia w:

- objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia.

Skład

10 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: lewodropropizyna 60 mg,
- substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), sacharoza, aromat truskawkowy 502301T: glikol propylenowy (E 1520) i substancje zapachowe, kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Działanie

Hamowanie kaszlu.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- **Dzieci powyżej 2. roku życia o wadze 10-20 kg:** 3 ml syropu, 3 razy na dobę.
- **Dzieci powyżej 2. roku życia o wadze 20-30 kg:** 5 ml syropu, 3 razy na dobę.
- **Dzieci o wadze powyżej 30 kg, młodzież i dorośli:** 10 ml syropu, 3 razy na dobę.
- Unituss Junior stosuje się doustnie, 3 razy na dobę, w odstępach wynoszących przynajmniej 6 godzin. Dołączona do butelki miarka pozwala łatwo odmierzyć 3, 5 i 10 ml syropu.

Nie należy stosować syropu Unituss Junior przez dłużej niż 7 dni bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną bądź którykolwiek z pozostałych składników syropu Unituss Junior.
- Obfita wydzielona oskrzelowa i zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).
- Ciąża, karmienie piersią.
- Nie podawać leku dzieciom poniżej 2. roku życia.