

Valinger, tabletki na potencję 25mg, 4 tabletki

Cena: 13,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	25 mg
Postać	tabl.powl.
Producent	ORION CORPORATION

Opis produktu

Lek wskazany w leczeniu zaburzeń wzrodu - impotencja. Substancja czynna sildenafil pomaga zwiększyć napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Zalecana dawka początkowa to 50 mg, czyli 2 tabletki. Lek Valinger należy zastosować na około godzinę przed planowanym stosunkiem.

Wskazania i działanie

Lek Valinger stosuje się w leczeniu mężczyzn z zaburzeniem wzrodu określanym niekiedy jako impotencja. Definiuje się to jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzrodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Lek Valinger zawiera substancję czynną - sildenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu (penisie), zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Valinger pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Zalecane stosowanie

Lek Valinger zawsze należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Zalecana dawka początkowa to 50 mg.

Leku Valinger nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Lek Valinger należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Możliwe działania niepożądane

Valinger może - podobnie, jak każdy inny lek - wywoływać działania niepożądane. Należy pamiętać, że nie u każdego one wystąpią.

Skład

Substancją czynną leku jest sildenafil.

Każda tabletkę zawiera 25 mg sildenafilu w postaci cytrynianu sildenafilu.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa. Otoczka: hypromeloza (2910; 6 mPa s), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotyna lak glinowy (E 132).

Ważne informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.