

Vigalex Forte 2000 IU, 120 tabletek



Cena: 49,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka	2 000 I.U.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.

Opis produktu

Lek Vigalex Forte 2000 IU w postaci małych, okrągłych tabletek, zawiera witaminę D3 (cholekalcyferol), która pełni istotną rolę w tworzeniu kości. Podczas niedoborów witaminy D mogą występować zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja).

Wskazania

Lek Vigalex Forte 2000 IU stosuje się pacjentów w wieku od 6 lat z prawidłową masą ciała:

- aby zapobiec niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych,
- w profilaktyce niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią w porozumieniu z lekarzem,
- zapobiegawczo w krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych,
- wspomagająco w leczeniu osteoporozy u dorosłych.

Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: cholekalcyferol 20 mg, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3),
- pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, all-rac- α -Tokoferol.

Działanie

Zapobieganie niedoborom witaminy D3.

Dawkowanie

Lek należy przyjmować jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dzieci od 6 do 10 lat z prawidłową masą ciała: 1000 IU na dobę.
- Młodzież od 11 do 18 lat z prawidłową masą ciała:
 - w celu zapobiegania niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę,
 - zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę.
- Dorośli z prawidłową masą ciała:
 - zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę,
 - zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę,
 - leczenie wspomagające osteoporozy: 2000 do 4000 IU na dobę.
- Kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiące piersią: aby ustalić dawkę dla pacjentki, należy poradzić się lekarza.
- Pacjenci z niewydolnością nerek: nie należy stosować u p
 - acjentów z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza.
 - Pacjenci z niewydolnością wątroby: nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Przeciwwskazania

- Kamica nerkowa lub ciężką niewydolność nerek.
- Gdy występuje uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tych leków.
- Jeśli występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) lub hiperkalciuria (nadmierne wydalania wapnia z moczem).
- W przypadku rzekomej niedoczynności przytarczyc.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Działania niepożądane

Lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe: zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka,
- nadwrażliwości skórne: świąd skóry, wysypka lub pokrzywka;
- w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi) i hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem). W pojedynczych przypadkach opisywano zejścia śmiertelne.

Interakcje

- Leki zobojętniające, zawierające glin stosowane w leczeniu nadkwaśności, stosowane razem z lekiem Vigalex Forte mogą prowadzić do zwiększenia stężenia glinu we krwi, nasilając przez to ryzyko toksycznego działania glinu na kości.
 - Leki zobojętniające zawierające magnez, stosowane równocześnie z lekiem Vigalex Forte mogą prowadzić do zwiększenia stężenia magnezu w krwi.
 - Niektóre leki o działaniu przeciwpadaczkowym, uspokajającym lub nasennym (zawierające fenytoinę lub barbiturany), stosowane równocześnie z lekiem Vigalex Forte, mogą zmniejszać jego działanie.
 - Leki moczopędne mogą prowadzić do hiperkalcemii (zwiększonego stężenia wapnia), wywołanej zmniejszonym wydalaniem wapnia przez nerki.
 - Przyjmowanie jednocześnie glikokortykosteroidów (hormony kory nadnerczy) może zmniejszać działanie leku Vigalex Forte.
 - Lek Vigalex Forte może powodować wzmożone działanie i toksyczność glikozydów naparstnicy, prowadzi to do ryzyka rozwoju zaburzeń rytmu serca.
 - Stosowanie jednocześnie metabolitów lub analogów witaminy D i leku Vigalex Forte jest możliwe wyłącznie na zalecenie lekarza, tylko w wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem kontroli stężenia wapnia w surowicy.
 - Ryfampicyna i izoniazyd mogą prowadzić do zmniejszenia działania leku Vigalex Forte.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podczas jednoczesnego przyjmowania innych preparatów zawierających witaminę D, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ do
- dodatkowe dawki witaminy D można przyjmować tylko pod nadzorem lekarza.
- Lek Vigalex Forte należy stosować pod nadzorem lekarza:
 - jeśli pacjent ma sarkoidozę (choroba układu odpornościowego, która może zwiększać stężenie witaminy D w organizmie),

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- podczas leczenia glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat,
- gdy stosowanie witaminy D jest długotrwałe (powyżej 3 miesięcy), gdyż w takim przypadku lekarz powinien sprawdzać stężenie wapnia w surowicy i w moczu oraz sprawdzać czynność nerek, oznaczając stężenie kreatyniny we krwi u pacjenta,
- lek zawiera w składzie sacharozę jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tych leków.

Ciąża, karmienie piersią

- Gdy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

- Lek Vigalex Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn