

Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10ml



Cena: 25,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka	20 000 j.m./ml
Producent	MERCK KGAA

Opis produktu

Wskazania

zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych, zapobieganie krzywicy u wcześniaków, zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych, zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych, leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

Skład

1ml # zawiera 500µg cholekalcyferolu # . Jedna kropla zawiera 12,5µg cholekalcyferolu #
odpowiada 500 IU witaminy D3). Substancje pomocnicze; triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Działanie

witamina D3 wykazuje wielokierunkowe działanie, m.in. reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, zwiększa wchłanianie wapnia i fosforanów w jelitach, wpływa na proces mineralizacji kości i jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz układu odpornościowego. Niedobory witaminy D3 mogą prowadzić do rozwoju krzywicy, zaburzeń mineralizacji kości, osteoporozy oraz zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego.

Dawkowanie

- wcześnieiki: 2 krople na dobę roztworu Vigantol # . Po osiągnięciu 40 tygodnia życia wieku skorygowanego dawkę profilaktyczną należy zmniejszyć. Dawkowanie musi być ustalone przez lekarza prowadzącego.
- noworodki i niemowlęta (do 12 miesiąca): 1 kropla na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 500 IU witaminy D3).

- dorośli, młodzież # i osoby w podeszłym wieku: 1 kropla na dobę roztworu Vigantol # witaminy D3).
- leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych: 2 krople na dobę roztworu Vigantol (co odpowiada 1000 IU witaminy D3).

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na substancję czynną cholekalcyferol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia i # hiperkalcynuria. Kamica nerkowa i # ciężka niewydolność nerek. Rzekoma niedoczynność przytarczyc # obniżone w okresach prawidłowej wrażliwości na tę witaminę. Przyjmowanie w tym okresie witaminy D o przedłużonym działaniu może prowadzić do powstania ryzyka przedawkowania. W takich sytuacjach należy przyjmować witaminę D, której stężenie łatwiej kontrolować. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.