Zincas Forte 27 mg, 50 tabletek

Cena: 23,31 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,027 g Zn2+ (0,15 g)
Producent	FARMAPOL SP. Z O.O. Z.CH.-F.

Opis produktu

Uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

Skład

Substancją czynną leku jest wodoroasparaginian dwuwodny. Pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokrystaliczna.

Działanie

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka na dobę, przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Przeciwwskazania

Uczulenie na cynku wodoroasparaginian dwuwodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, niewydolność nerek, antybiotykoterapia lub przyjmowanie innych leków. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, nie należy przyjmować leku jednocześnie z produktami mlecznymi, nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie należy stosować leku jednocześnie z następującymi lekami: antybiotyki z grupy tetracyklin (na przykład doksycyklina), ponieważ cynk zmniejsza ich wchłanianie; zawierające kwas acetylosalicylowy; leki przeciwbólowe zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (ibuprofen, indometacyna); leki zwiększające wytwarzanie moczu (hydrochlorotiazamid); kortykosteroidy- zwane sterydami (hydrokortyzon); leki i suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź- ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku; substancje chelatujące (penicylamina); lek stosowany w leczeniu (zatruciu ołowiem lub miedzią). Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.